

核准日期：2007 年 10 月 16 日

修改日期：2009 年 3 月 13 日 2015 年 6 月 8 日

注册商标

头孢克肟分散片说明书

注册商标

请仔细阅读说明书并在医师指导下使用

【药品名称】

通用名称：头孢克肟分散片

商品名称：世福素


英文名称：Cefixime Dispersible Tablets

汉语拼音：Toubaokewo Fensanpian

【成份】本品主要成份为头孢克肟。

化学名称：(6R, 7R)-7-[[(Z)-2-(2-氨基-4-噻唑基)-2-(羧甲氧基)亚氨基]乙酰基]氨基]-3-乙烯基-8-氧代-5-硫杂-1-氮杂双环[4.2.0]辛-2-烯-2-羧酸三水合物。

化学结构式：



分子式： $C_{16}H_{15}N_5O_7S_2 \cdot 3H_2O$

分子量：507.50

【性状】本品为白色至淡黄色片。

【适应症】

本品适用于对头孢克肟敏感的链球菌属(肠球菌除外)，肺炎球菌、淋球菌、卡他布兰汉球菌、大肠杆菌、克雷伯杆菌属、沙雷菌属、变形杆菌属及流感杆菌等引起的下列细菌感染性疾病：

1. 支气管炎、支气管扩张症（感染时），慢性呼吸系统感染疾病的继发感染，肺炎；
2. 肾盂肾炎、膀胱炎、淋球菌性尿道炎；
3. 胆囊炎、胆管炎；
4. 猩红热；
5. 中耳炎、副鼻窦炎。

【规格】100mg

【用法用量】

1. 成人和体重 30 公斤以上的儿童：本品可直接口服，或将本品加入适量温开水中待分散溶解后（可以搅拌）服用，每次 50~100mg（效价）（每次半片~1 片），一日二次。此外，可以根据年龄、体重、症状进行适当增减，对重症患者，可每次口服 200mg（效价）（每次口服 2 片），一日二次。

2. 小儿，本品可直接口服，或将本品加入适量温开水中待分散溶解后（可以搅拌）服用，每次 1.5~3mg（效价）/kg（体重），一日二次。此外，可以根据症状进行适当增减，对于重症患者，每次可口服 6mg（效价）/kg（体重），一日二次。

儿童一日二次，每次按下列剂量口服：

6个月至1岁每次1/7~1/5片；

1岁至2岁每次1/5~1/4片；

2岁至4岁每次1/4~1/3片；

4岁至6岁每次1/3~2/5片；

6岁至9岁每次2/5~1/2片；

9岁至14岁每次1/2~2/3片；

14岁至18岁每次2/3~1片。

【不良反应】

临床研究资料表明，本品主要不良反应为包括腹泻等消化道反应(0.87%)、皮疹等皮肤症状(0.23%)、临床检查值异常(包括GPT升高(0.61%)、GOT升高(0.45%)、嗜酸细胞增多(0.20%)等。具体如下：

1. 严重不良反应：

(1) 休克：有引起休克(<0.1%)的可能性，应密切观察，如有出现不适感，口内异常感、哮喘、眩晕、便意、耳鸣、出汗等现象，应停止给药，采取适当处置。

(2) 过敏性症状：有出现过敏样症状(包括呼吸困难、全身潮红、血管性水肿、荨麻疹等)(<0.1%)的可能性，应密切观察，如有异常发生时停止给药，采取适当处置。

(3) 皮肤病变：有发生皮肤粘膜眼症候群(Stevens-Johnson症候群0.1%)、中毒性表皮坏死症(即Lyell症候群，<0.1%)的可能性，应密切观察，如有发生发热、头痛、关节痛、皮肤或粘膜红斑、水泡、皮肤紧张感、灼热感、疼痛等症状，应停止给药，采取适当处置。

(4) 血液障碍：有发生粒细胞缺乏症(<0.1%，早期症状：发热、咽喉疼、头疼、倦怠感等)、溶血性贫血(<0.1%，早期症状：发热、血红蛋白尿、贫血等症状)、血小板减少(<0.1%，早期症状：点状出血、紫斑等)等的可能性，且也有同其它头孢类抗生素一样的造成全血细胞减少的报告，因此应密切观察，例如进行定期检查等，有异常发生时应停止给药，采取适当处置。

(5) 肾功能障碍：有引起急性肾功能不全等严重肾功能障碍(<0.1%)的可能性，因此应密切观察，例如定期进行检查等，如有异常发生时，应停止给药，采取适当处置。

(6) 结肠炎：可能引起伴有血便的严重大肠炎例如伪膜性结肠炎等(<0.1%)。如有腹痛、反复腹泻出现时，应立即停止给药，采取适当处置。

(7) 有发生间质性肺炎(有出现伴有发热、咳嗽、呼吸困难、胸部X线异常，嗜酸细胞增多等症状)及PIE症候群(均<0.1%)等的可能性，如有上述症状发生应停止给药，采取给予糖皮质激素等适当处置。

2. 其它不良反应：

	0.1~<5%	<0.1%
过敏症	皮疹、荨麻疹、红斑	瘙痒、发热、浮肿
血液	嗜酸细胞增多	粒细胞减少
肝脏	GOT升高、GPT升高、AL-P升高	黄疸
肾脏		BUN升高
消化系统	腹泻、胃部不适	恶心、呕吐、腹痛、胸部烧灼感、食欲不振、腹部饱满感、便秘
菌群失调症		口腔炎、口腔念球菌症
维生素缺乏症		维生素K缺乏症(低凝血酶原血症，出血倾向等)，维生素B缺乏症(舌炎、口腔炎、食欲不振、神经炎等)
其它		头痛、头晕

【禁忌】对本品及其成份或其他头孢菌素类药物过敏者禁用。

【注意事项】

1. 由于有可能出现休克，给药前应充分询问病史。
2. 为防止耐药菌株的出现，在使用本品前原则上应确认敏感性，将剂量控制在控制疾病所需最小剂量。
3. 对于严重肾功能障碍患者，由于药物在血液中可维持浓度，因此应根据肾功能状况适当减量，给药间隔应适当增大。（参照[药代动力学]数据）
4. 下列患者慎重给药：
 - （1）对青霉素类药物有过敏史的患者；
 - （2）本人或父母、兄弟中，具有易引起支气管哮喘、皮疹、荨麻疹等过敏症状体质的患者。
 - （3）严重的肾功能障碍患者（参照[药代动力学]数据）。
 - （4）经口给药困难或非经口摄取营养患者，全身恶液质状态患者（因时有出现维生素K缺乏症状，应注意观察）。
5. 对临床检验结果的影响：
 - （1）用斑氏（Benedict）试剂、费林氏（Fehling）试剂、尿糖试纸（Clinitest）进行尿糖检查，有假阳性出现的可能性，应予以注意。
 - （2）有出现直接库姆斯试验假阳性的可能性，应予以注意。
6. 不要将牛奶、果汁等与药混合后放置。
7. 其他 在幼小的大白鼠实验中，口服 1000mg/kg 以上时，有抑制精子形成的作用。

【孕妇及哺乳期妇女用药】

小鼠及大鼠剂量达人剂量 400 倍时的生殖试验未见对胎鼠损害的证据。
关于妊娠用药的安全性尚未确定，故对孕妇或有妊娠可能性的妇女用药时，须权衡利弊，当利大于弊时方可用药。
未研究头孢克肟对分娩的影响，只有在明确需要使用本品时，方可使用。
头孢克肟是否经人乳排泄尚不清楚。在使用本品时，应考虑暂停授乳。

【儿童用药】头孢克肟对小于 6 个月的儿童的安全性和有效性尚未确定。

【老年用药】

本品在老年人中的血药峰浓度和 AUC 可较年轻人分别高 26%和 20%，老年患者可以使用本品。

肾功能不全患者应调整给药剂量，肌酐清除率 $\geq 60\text{ml/分}$ 的患者可按普通剂量及疗程使用。肌酐清除率为 $21\sim 60\text{ml/分}$ 或血液透析患者可按标准剂量的 75%（标准给药间隔）给予。肌酐清除率 $< 20\text{ml/分}$ 或常久卧床腹膜透析患者可按标准剂量的一半（标准给药间隔）给予。

【药物相互作用】

药名	临床症状·措施方法	机制，危险因素
苜蓿三酚香豆素	有使苜蓿三酚香豆素作用增强的可能性。但是关于本制剂尚无病例报告。	由于本品可能导致肠内细菌紊乱，可造成维生素K合成抑制。

【药物过量】

由于没有特异的解救药物，建议洗胃。
血液透析或腹膜透析均不能明显从体内除去头孢克肟。

【药理毒理】

1. 药理作用

本品为口服第三代头孢菌素，抗菌谱广，对部分革兰氏阳性菌及阴性菌均具有抗菌活性，特别是对革兰氏阳性菌中的链球菌（肠球菌除外）、肺炎球菌，革兰氏阴性菌中的淋球菌、布兰汉氏球菌、大肠菌、克雷伯氏属、沙雷氏属、变形杆菌属、流感杆菌等有较强的抗菌作用，其作用机制为杀菌性的。

本品对各种细菌产生的β-内酰胺酶具有较强的稳定性，对产生β-内酰胺酶细菌显示优越的抗菌力。

本品作用机制为阻止细菌细胞壁的合成，其作用点因细菌的种类而异，与青霉素结合蛋白（PBP）中1（1a, 1b, 1c）以及3有较高亲和性。

2. 毒理研究

(1)、急性毒性(LD₅₀mg/kg)

给药途径	动物种类		小鼠		大鼠	
	性别		雄	雌	雄	雌
口服			>10.000	>10.000	>10.000	>10.000
皮下注射			>10.000	>10.000	>10.000	>10.000
静脉注射			5.840	4.420	6.990	7.870

(2)、亚急性、慢性毒性

对于成年SD大白鼠以100, 320及1,000mg/kg口服给药13周，成年犬以100, 200及400mg/kg口服给药5周，所有的实验均未发现异常。

对于成年的SD族大白鼠以100, 320及1,000mg/kg口服给药53周的实验中，血常规、血液化学（包括肝肾功能）与对照组比较无明显改变，病理组织检查发现1000mg/kg剂量组雄性动物慢性肾病的发生率及程度均比对照组严重。1000mg/kg剂量组雌鼠体重增加受抑制，肾脏重量增加，盲肠的重量亦见显著增加。

(3)、对生殖系统的影响

对SD族大白鼠在妊娠前和妊娠初期口服给药100~1,000mg/kg，在器官形成期，围产期，哺乳期口服给药320~3,200mg/kg观察其对生殖系统的影响，结果没有发现其影响大白鼠的繁殖能力和致畸作用。新生幼鼠的生长、发育和生殖能力也未发现异常。

3. 对肾的影响

一次给兔子口服1000mg/kg该药，观察其对肾脏的影响，没有发现异常。

SD族大白鼠口服给药560mg/kg并同利尿药速尿合用，连续2周没有出现用药后的异常情况，亦没有出现因利尿剂所导致的肾功能恶化。

4. 抗原性

本药对各种动物的抗原性同头孢氨苄相同或稍弱。本药没有诱发抗原性，亦不与头孢氨苄、头孢克罗及头孢噻肟呈免疫交叉性。

【药代动力学】

我国目前尚缺乏本品详细的药代动力学研究资料，国外药代动力学研究资料表明：

1. 吸收：

(1)正常成人空腹口服一次50、100、900mg（效价），约4小时后血清浓度达到峰值，分别为0.69, 1.13, 1.95 μg/ml，血清浓度半衰期为2.3~2.5小时。肾功能正常的小儿患者口服一次1.5, 3.0, 6.0mg（效价）/kg（体重）后，约3~4小时血清浓度达到峰值，分别为1.14, 2.01, 3.97 μg/ml，血清浓度半衰期为3.2~3.7小时。

(2)对于中度肾功能衰竭组（30≤Ccr<60ml/min, n=3）及重度肾功能衰竭组（10≤Ccr<30ml/min, n=4），分别单次服用头孢克肟100mg进行比较。中度肾衰为服用后6小时血清浓度达峰值为2.04 μg/ml，重度肾衰组为服用后8小时峰值为2.27 μg/ml，12小时后血

清中浓度分别为 0.71 $\mu\text{g/ml}$, 1.83 $\mu\text{g/ml}$, 重度肾衰组峰值出现时间及血清中维持时间均长, 半衰期分别为 4.15 小时及 11.05 小时。

2. 分布: 本品在患者痰液中, 扁桃组织, 上鄂窦粘膜组织, 中耳分泌物, 胆汁, 胆囊组织等的渗透性良好。

3. 代谢: 在人体的血清、尿中未发现具有抗菌活性代谢产物。

4. 排泄: 主要经肾脏排泄, 正常成人(空腹时)口服 50, 100, 200mg (效价), 尿中排泄率(0~12 小时)约为 20~25%, 最高尿中浓度分别为 42.9(4~6 小时), 62.9(4~6 小时), 82.7 $\mu\text{g/ml}$ (4~6 小时)。另外, 肾功能正常的小儿患者经口服用 1.5, 3.0, 6.0mg (效价)/kg 后尿中排泄率(0~12 小时)约为 13~90%。

【贮藏】遮光, 密封, 在阴凉处(不超过 20 $^{\circ}\text{C}$)保存。

【包装】铝塑包装, 每板 6 片, 每袋 1 板, 每小盒 1 袋;

铝塑包装, 每板 10 片, 每袋 1 板, 每小盒 1 袋。

【有效期】24 个月

【执行标准】《中国药典》2010 年版第三增补本

【批准文号】国药准字 H20030048

【生产企业】

企业名称: 注册商标 广州白云山医药集团股份有限公司白云山制药总厂

生产地址: 广州市白云区同和街云祥路 88 号 邮政编码: 510515

质量服务电话: (020)87063679

销售服务电话: (020)87573176

传真号码: (020)87061075

网址: <http://www.byszsc.com>